

Краткое сообщение

Особенности психического статуса потребителей дизайнерских наркотиков

Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б., Гостюнина Л.С., Вязовченко В.А.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Поступила в редакцию 26 января 2017 г., Принята в печать 16 марта 2017 г.

© 2017, Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б., Гостюнина Л.С., Вязовченко В.А.

© 2017, Психосоматические и интегративные исследования

Резюме:

Злоупотребление наркотическими веществами до сих пор остается одной из важнейших медико-социальных проблем. Целью данного исследования является изучение особенностей психического статуса потребителей дизайнерских наркотиков.

Ключевые слова: злоупотребление психоактивными веществами, дизайнерские наркотики, психический статус.

Библиографическая ссылка: Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б., Гостюнина Л.С., Вязовченко В.А. Особенности психического статуса потребителей дизайнерских наркотиков. Психосоматические и интегративные исследования 2017; 3: 0102.

Review

Mental status peculiarities of designer drug users

Abrosimova Yu.S., Barylnik Yu.B., Gostyunina L.S., Vyazovchenko V.A.

FSBEI of Higher Education, Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky of the Ministry of Health of the Russian Federation, department of psychiatry, narcology, mental therapy and clinical psychology

Received on 26 Jan 2017, Accepted on 16 Mar 2017

© 2017, Abrosimova Yu.S., Barylnik Yu.B., Gostyunina L.S., Vyazovchenko V.A.

© 2017, Psychosomatic and Integrative Research

Summary:

Drug abuse still remains one of the most important medical and social problems. The goal of this research is study of mental status peculiarities of designer drug users.

Keywords: drug abuse, designer drugs, mental status.

Cite as Abrosimova Yu.S., Barylnik Yu.B., Gostyunina L.S., Vyazovchenko V.A. Mental status peculiarities of designer drug users. Psychosomatic and Integrative Research 2017; 3: 0102.

Актуальность

Злоупотребление наркотическими веществами до сих пор остается одной из важнейших медико-социальных проблем. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности за период с 2007 по 2014 год количество злоупотребляющих наркотическими веществами в мире увеличилось в среднем на 20% [1]. Ежегодно растет число новых психоактивных веществ, только в 2014 году, по информации УНП ООН, было сообщено о 66 [2]. Проблему употребления наркотических веществ следует рассматривать не только как проблему физиологическую, но и как проблему личности, прибегающей к наркотикам в конкретной социальной ситуации [3].

Актуальность обусловлена преобладанием лиц молодого возраста среди потребителей дизайнерских наркотиков, случаями летальных исходов в результате их применения, недостаточной изученностью фармакологических эффектов, а значит невозможностью предсказать отдаленные последствия злоупотребления.

Целью данного исследования является изучение особенностей психического статуса потребителей дизайнерских наркотиков (ДН).

Задачи:

1. Выявить основные индивидуально-психологические особенности личности, страдающих зависимостью от наркотиков и лиц без аддикций.
2. Исследовать уровень тревожности у пациентов с наркозависимостью.

Материал и методы

В основу работы положены материалы исследования 6 пациентов мужского пола, проходивших лечение в Областной психиатрической больнице Святой Софии, 11 анонимно опрошенных вне ЛПУ лиц, злоупотребляющих ДН (10 мужчин и 1 женщина) в возрасте от 23 до 40 лет, и 17 человек группы контроля - лиц без аддикций с аналогичными поло-возрастными характеристиками.

Для оценки психического статуса данных групп были использованы следующие методы:

- 1) клинический метод (работа с картами пациентов и клиническое интервью);
- 2) психометрический метод.

Симптоматический опросник SCL-90-R (англ. Symptom Check List-90-Revised) и шкала тревоги Спилбергера.

В опроснике SCL-90-R для оценки психического статуса использовались следующие психодиагностические шкалы:

- соматизация;
- обсессивность-компульсивность;
- межличностная сензитивность;
- депрессия;
- тревожность;
- враждебность;
- фобическая тревожность;
- паранойяльность;
- психотизм.

Шкала тревоги Спилбергера оценивает два уровня тревожности - ситуационную (возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением) и личностную (представляет собой конституциональную черту, обуславливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций)[4].

Результаты

На момент исследования 35% обследованных (6 человек) находились на лечении в Саратовской областной психиатрической больнице Святой Софии. В исследование были включены пациенты, имеющие следующие диагнозы: «Психические и поведенческие расстройства в результате употребления стимуляторов (соль). Синдром отмены с делирием», «Шизофреноподобное расстройство, вызванное употреблением синтетических каннабиноидов». 65% обследованных (11 человек) были анонимно опрошены вне медицинских учреждений, 18% из которых (2 человека) когда-либо проходили лечение, связанное со злоупотреблением ПАВ.

В 89% случаев имело место сочетанное употребление ДН и других ПАВ (героин, кокаин, амфетамин, метамфетамин, метилendioксиметамфетамин, ЛСД). Наиболее употребляемыми ДН явились психостимуляторы группы синтетических катинонов: метилendioксипировалерон (МДПВ), мефедрон, метамфепрамон, альфа-пирролидиновалерофенон). Употребление исключительно синтетических каннабиноидов было выявлено у двух исследуемых (11 %). Наиболее распространенным путем введения ПАВ был внутривенный.

Все исследуемые отмечали появление нежелательных эффектов при приеме ДН, которые возникали как на высоте интоксикации, так и в постинтоксикационном периоде. Потребители стимуляторов чаще всего отмечали появление слуховых и зрительных галлюцинаций, идей преследования, подозрительности, усталости, снижение настроения, бессонницу, снижение аппетита, потерю массы тела. У ряда пациентов наблюдался немотивированный страх, паника, возбудимость, агрессивность, необходимость многократно повторять действия, а также тошнота, рвота, головная боль. У потребителей синтетических каннабиноидов наблюдались идеи преследования, дереализация, подозрительность, немотивированный страх, тремор, галлюцинации, головокружение, тошнота.

Наличие переживаний по поводу изменения собственной личности наблюдалось у 76% опрошенных. Из них 24% указывали на появление агрессивности, 29% - подозрительности, недоверия к окружающим, чувство несправедливости по отношению к себе, 24% отмечали появление раздражительности, эмоциональной лабильности, импульсивности, ревности, 23% - ненадежности, лживости, неспособности к планомерной деятельности.

Таблица 1. Средние значения психопатологических показателей

Диагностическая шкала	Потребители ДН	Группа контроля
Враждебность	1,13	0,28
Паранойяльность	1,25	0,4
Психотизм	1	0,2
Соматизация	0,82	0,33
Тревожность	1,39	0,15
Межличностная сензитивность	1,06	0,3
Фобическая тревожность	0,66	0,08
Обсессивность-компульсивность	1,18	0,44
Депрессия	1,302	0,25

При исследовании психического статуса с использованием опросника SCL- 90 получены средние значения психопатологических показателей (см. таблица 1).

При оценке ситуативной и личностной тревожности с использованием шкалы тревожности Спилбергера в группе потребителей ДН выявлены следующие показатели: ситуативная тревожность – 2,44, личностная тревожность – 2,48, что соответствует средней степени тревожности. В группе контроля: ситуативная тревожность – 1,67, личностная – 1,72, что соответствует низкой степени тревожности.

Выводы

Потребители наркотиков исследуемой группы регулярно использовали как дизайнерские наркотики, так и ПАВ из других групп. Средние значения показателей по всем диагностическим шкалам опросника SCL-90 в группе потребителей ДН превышают таковые в группе контроля. Наибольшей выраженностью в группе потребителей ПАВ характеризовались следующие показатели: тревожность, депрессия, паранойяльность, враждебность. Минимальное значение было выявлено для показателя фобической тревожности.

У потребителей ПАВ в исследуемой группе выявлена более высокая тревожность в сравнении с лицами без аддикций.

Таким образом, для потребителей ДН характерно наличие психопатологических симптомов, отражающих изменения в различных сферах психической деятельности и нуждающихся в своевременном выявлении и медикаментозной коррекции.

Список литературы

1. World Drug report 2016: Global trends in the estimated number of people who uses drugs, 2006-2014, United Nations Office on Drugs and Crime.
2. World Drug report 2016: Number of new psychoactive substances reported in 2014, United Nations Office on Drugs and Crime.
3. Гамыла М. Е., Серебрянский Ю. Е. Психологические детерминанты наркозависимого поведения личности/ М.Е. Гамыла, Ю. Е. Серебрянский // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. - 2009. - №4. - С. 48-54.
4. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. - М., 2002. - 439 с.

Авторы:

Абросимова Ю.С. – к.м.н, доцент кафедры ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии, julia-abrosimova@yandex.ru

Барыльник Ю.Б. – д.м.н., зав.кафедрой ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии.

Вязовченко В.А. – студентка 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии.

Гостюнина Л.С. – студентка 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии.